

O que são implantes dentários?

O implante dental é a opção ideal para quem deseja repor alguns, ou mesmo todos os dentes. A cirurgia é feita através da colocação de pinos de titânio, que substituirão as raízes dentárias. Esta moderna técnica pode devolver o sorriso, a mastigação forte e segura, a autoestima do paciente com ótimos resultados estéticos e funcionais e além disso preserva a estrutura óssea dos maxilares evitando reabsorções e mantendo a estética facial.

Quem pode usar implantes?

Implantes podem ser instalados em qualquer paciente que tenha clínicas e anatômicas adequadas como boa saúde geral, suporte ósseo suficiente, tanto em altura quanto em espessura. E se o paciente não tem o osso necessário, é possível fazer um enxerto ósseo (colocar osso onde falta). Em caso de necessidade de enxerto, ele deve ser feito 6 meses antes da instalação do implante, para que dê tempo do osso se formar na região.

E o corpo não rejeita os implantes?

Difícilmente. Eles são confeccionados em titânio, um metal 98% biocompatível. E quando essa rejeição (a falha da integração entre o implante e o osso) acontece, geralmente se dá em fumantes severos e em pacientes diabéticos não-compensados. O motivo da rejeição costuma ser a menor vascularização (disponibilidade de sangue) na região do implante, o que é comum nesses pacientes. Como a boca é um local contaminado, mesmo com todos os cuidados de anti-sepsia pode ocorrer infecção no local e levar a perda do implante, mas é um percentual muito pequeno. Não! O implante dentário é feito com titânio, um material biocompatível, portanto não é rejeitado pelo organismo. O que pode acontecer em raros casos é o insucesso por falha na união do implante com o osso.



Dr. Leandro Benetti de Oliveira
Especialista e Mestre em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial

Clínica Odontorizzo - S. J. do Rio Preto
Rua Adib Buchala, 167 - São Manoel - 15091-320
Fone: 17 **3121 7889** | WhatsApp: 17 **98189-7889**

Consultório - Bebedouro
Rua Cel. Conrado Caldeira, 397 - Centro - CEP 14701-000
Fone: 17 **3343 1364**

www.drleandrobenneti.com.br/



Implantes Dentários
Orientando o paciente

Perguntas e Respostas



Se o implante falhar eu posso tentar de novo?

Sim, os riscos de uma falha são mínimos, mas em alguns casos ocorrem. Há necessidade de avaliar as causas do insucesso e realizar novamente a cirurgia de implante.

A instalação do implante dói?

Não. Todo o processo é realizado sob anestesia local. Nos primeiros dias pode ocorrer um pequeno inchaço por se tratar de um procedimento cirúrgico, porém é uma condição controlada com medicamentos que o dentista irá prescrever conforme a necessidade. O desconforto varia de acordo com a extensão da cirurgia e do próprio organismo do paciente, mas não deve causar transtornos significativos.

Dá pra extrair o dente e já instalar o implante?

Quando o dente está condenado, o implante que irá substituí-lo até pode ser colocado no mesmo dia da extração (quando não há nenhum tipo de lesão na raiz desse dente), porém em algumas situações é necessário aguardar de 2 a 3 meses para que o alvéolo (o buraco onde estava o dente) cicatrize, se forme osso novo e, só então, instalar o implante.

Mas não dá pra colocar prótese no mesmo dia que o implante?

Dá, mas somente uma prótese provisória e em algumas situações específicas. O nome dessa técnica é carga imediata. O torque (força com que o implante é travado no osso) precisa ser de no mínimo 45N, o que nem sempre é possível. Se não for respeitada essa regra e colocada a prótese provisória mesmo assim, o implante provavelmente será perdido. Mas não se preocupe, você não precisa ficar sem dente caso não seja possível a carga imediata. É possível usar uma prótese parcial removível apoiada nos outros dentes mantendo assim a estética, fonética e função mastigatória.

E a prótese sobre o implante?

A prótese geralmente é colocada de 4 a 6 meses depois da instalação do implante. A gengiva é reaberta e o tapa-implante (uma pecinha que fica na cabeça do implante) é substituído por um cicatrizador, que serve para dar forma à gengiva, deixando ela prontinha para receber a prótese.

E dá pra usar implantes para fixar a dentadura?

Sim. A prótese total sobre implantes pode ser fixa, chamada de protocolo podendo ser realizada tanto na maxila (arco superior) quanto na mandíbula (arco inferior). A principal vantagem e devolver a função mastigatória. Com o sistema comum de dentadura, o paciente tem em média 20% do poder de mastigação original, já com o protocolo fixo sobre implantes, esse percentual sobe para 85%. Desta maneira o objetivo da reabilitação com uso de implantes é devolver os princípios de estética, fonética e função mastigatória ao paciente.

Quais os cuidados que devemos ter depois que colocamos o implante e a prótese?

Toda prótese está sujeita a acidentes durante o ato mastigatório. O paciente deve evitar alimentos excessivamente duros e de pigmentação forte. O controle da placa bacteriana deve ser o mesmo para implantes e os dentes naturais. O controle periódico deve ser feito pelo dentista, pelo menos uma vez de cada 6 meses.

Quanto tempo dura um implante dental?

Com um planejamento adequado, boa saúde do paciente e condições ideais de higienização oral e manutenção, o implante é definitivo e não há necessidade de remoção ou troca.

O que é enxerto ósseo?

Quando ocorre a perda de um dente, o osso que estava ao redor da raiz vai se perdendo gradativamente, em um processo chamado reabsorção óssea. Em casos que não há osso suficiente para fixação do implante, é necessário repor o osso perdido, através de cirurgias para a colocação do enxerto ósseo. Há diversas técnicas cirúrgicas e materiais utilizados no tratamento que vai depender da extensão e quantidade necessária. Os enxertos podem ser feitos previamente ou na mesma sessão da colocação do implante.

O que são implantes zigomáticos?

São implantes específicos para pacientes com pouca condição óssea para colocação de implantes convencionais, e que não podem ser submetidos à cirurgia de enxertia óssea. Implantes zigomáticos - São os implantes fixados no osso zigomático, popularmente conhecido como "maçã do rosto". É indicado para pacientes que tiveram reabsorções ósseas severas em toda a maxila, somente pode ser feito na parte superior da boca e o procedimento é realizado somente no hospital com anestesia geral.



Observe atentamente suas características faciais e dentárias.

Olhe-se em fotografias e em frente ao espelho, e responda as questões abaixo.

- Seus dentes se encaixam perfeitamente?
- Quando você sorri, quanto tecido gengival surge por debaixo de seus lábios, logo acima dos dentes?
- Seus lábios se aproximam espontaneamente ou há abertura excessiva entre eles?
- Há harmonia entre a projeção de seu nariz, lábios e queixo?
- Você sente dores ou desconforto em sua articulação mandibular?
- Respira livremente sem obstruções, apresenta ronco noturno ou sono não - reparador?

Todas estas são questões que podem fazer de você um candidato à Cirurgia Ortognática.



Dr. Leandro Benetti de Oliveira
Especialista e Mestre em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial

Clinica Odontorizzo - S. J. do Rio Preto
Rua Adib Buchala, 167 - São Manoel - 15091-320
Fone: 17 **3121 7889** | WhatsApp: 17 **98189-7889**

Consultório - Bebedouro
Rua Cel. Conrado Caldeira, 397 - Centro - CEP 14701-000
Fone: 17 **3343 1364**

www.drleandrobenetti.com.br/



Terceiro Molar (Dente do Siso). Orientando o paciente

Perguntas e Respostas



O que são Dentes do Siso?

Os dentes do siso ou dentes do juízo, como são popularmente chamados, são os terceiros molares na linguagem usada pelos dentistas, e na maioria das vezes têm indicação para extração. Boa parte da população necessita retirar este dente, já que a permanência do mesmo pode implicar em grandes problemas estruturais e de saúde geral.

Quantos dentes do siso existem?

Salve algumas exceções, a maioria das pessoas apresentam 4 dentes do siso: dois superiores, um direito e um esquerdo, e dois inferiores, também direito e esquerdo.

Em que idade eles normalmente erupcionam?

Geralmente estes dentes, sofrem erupção, ou seja, "nascem", por volta dos 17 aos 20 anos de idade.

Por que as vezes eles não erupcionam?

O dente do siso não está presente em todas as pessoas, algumas vezes porque a pessoa não tem o germe deste dente e outras vezes porque ele não erupcionou por falta de espaço na arcada dental ou por estar na posição "errada" dentro do osso.


O que acontece se ele ficar dentro do osso (não erupcionar)?

Se o terceiro molar permanecer dentro do osso, ele pode produzir reabsorções de dentes vizinhos, transtornos dolorosos ao paciente e possíveis lesões císticas.

O que acontece se ele erupcionar parcialmente

Mas se o dente erupcionar parcialmente ele pode vir a gerar um quadro infeccioso inflamatório, que é conhecido por pericoronarite e tal quadro gera muita dor para o paciente, além de inchaço, mau odor e irritação local.

Além de todos estes itens, estes dentes ainda podem ser responsáveis por fortes dores faciais e enxaquecas, por comprimir os feixes nervosos, na dependência da sua posição dentro dos ossos maxilares.



Quando é indicada a extração do siso?

Estes dentes devem ser extraídos quando os mesmos estiverem causando dor ou inflamação, quando o espaço não for suficiente na arcada dentária para a correta erupção dos mesmos ou quando os dentes estiverem mau posicionados dentro do osso. Por ser responsável por tantos inconvenientes, estes dentes são geralmente extraídos, mesmo sendo dentes íntegros, ou seja, inteiros (sadios).

Como será o período após a cirurgia?

Orientamos aos nossos Clientes que a cirurgia para remoção de um, parte ou os quatro sisos é realizada em um tempo operatório reduzido, com segurança, rapidez, técnica precisa e geralmente sem qualquer dor. Todas as orientações e prescrições necessárias para um pós-operatório confortável são fornecidas por escrito e adequadas para cada caso em particular, antes da intervenção cirúrgica.

Quanto tempo demora a recuperação?

Geralmente as pessoas operadas necessitam de um período de repouso que varia de um a três dias após a cirurgia. É evidente que até a alta completa do tratamento, as atividades físicas, banhos de sol e os excessos deverão ser evitados.